

- neobsazené úly i další chovná zařízení musí být zbaveny včelího díla a celoročně zajištěny proti možnému vnikání včel.

Čl. 5

Pozorovací doba a zdolání nákazy

(1) Pozorovací doba trvá 12 měsíců od nařízení těchto mimořádných veterinárních opatření. Nákaza se prohlásí za zdolanou, jestliže se ve smíšeném vzorku zimní měli odebraném následujícího roku v ohnisku nezjistí původce této nákazy.

Čl. 6

Přemísťování včelstev

(1) V souladu s ustanovením § 134 odst.1 vyhlášky MZe č. 299/2003 Sb. v platném znění se trvalé přemísťování včelstev povoluje jen do oblastí se stejnou nebo horší nákazovou situací. Přesunuta mohou být pouze včelstva vyšetřená na varroázu a léčebně ošetřená na základě nařízených ochranných a zdolávacích opatření a v souladu s nimi.

- V rámci územního obvodu Plzeňského kraje jsou trvalé přesuny vázány na písemný souhlas KVSP, který se vydá dle místa původu včelstev.
- Mimo územní obvod Plzeňského kraje lze trvalý přesun včelstev uskutečnit za předpokladu, že přemísťovaná včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem - inspektorem KVSP dle místa původu včelstev. Přemísťovaná včelstva musí být před přesunem mimo kraj bakteriologicky vyšetřena na přítomnost moru včelího plodu, tuto skutečnost doloží chovatel příslušným dokladem - laboratorním protokolem s negativním výsledkem vyšetření smíšeného vzorku měli, před vystavením veterinárního osvědčení pro přesun.

(2) **Přesun včelstev kočováním** lze uskutečnit za následujících podmínek:

- Obecně do oblastí o stejné nákazové situaci, přičemž za horší nákazovou situaci se považují oblasti (ohniska a jejich ochranná pásma, event. vyhlášené úseky hraničních pásem) s potvrzeným výskytem rezistentních roztočů, a to bez ohledu na intenzitu a extenzitu nákazy.
- Byla-li včelstva na trvalém stanovišti vyšetřena laboratorně na mor včelího plodu s negativním výsledkem.
- V případě přesunu včelstev mimo hranici Plzeňského kraje si musí chovatel vyžádat vystavení veterinárního osvědčení na KVSP.
- Kočující včelstva musí být neprodleně po každém návratu po 01.06.2012 z kočovného stanoviště (na trvalém stanovišti nebo na dalším kočovném stanovišti) preventivně přeléčena, a to FORMIDOLEM, pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu a přípravkem GABON PA 92 (resp. Gabon PA 1,5 mg) nebo GABON PF 90, pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu a nejde o oblast s rezistencí roztočů. V oblastech se zjištěnou rezistencí roztoče *Varroa destructor* vůči léčivům se v případě silného napadení provede ošetření v souladu s čl. 3 bod (1) písm. e) – FORMIDOLEM (opakovaně) či pomocí přípravků na bázi thymolu.